

# Nimotop - Nimodipine

Efni: Lyf og lyfjagjafir

Ábyrgð: Gjörgæsla - yfirlæknir

Út



SJÚKRAHÚSIÐ Á AKUREYRI  
AKUREYRI HOSPITAL

Nimotop® - Nimodipine	
1 hettuglas = 250 ml Nimodipine 0,2 mg/ml = 50 mg	
<b>Ábendingar</b>	Notað til að draga úr æðakrampa eftir blæðingar/áverka á heila. Má nota sem blóðþrýstinglækkandi lyf.
<b>Eiginleikar</b>	Nimotop er kalsíumgangahemill (L-type) og veldur fyrst og fremst æðaútvíkkun í slagæðum. Mótvirkar einnig saltsteravirkni í nýrum.
<b>Aukaverkanir</b>	Blóðþrýstingsfall, húðroði, sviti, svimi og ógleði, blóðflögufæð.
<b>Dreypi</b>	Gefið <u>óblandað</u> í þriggja rása krana þar sem NaCl 0,9% eða Ringer lausn rennur með. Gefist helst í miðbláæðalegg. Má einnig renna með dextranlausnum, HES, mannitoli, albúmíni og rauðkornabykkni.
<b>Skammtar</b>	Byrja á að gefa <b>10 µg/kg/klst</b> í 2 klukkustundir. Auka þá í <b>15-30 µg/kg/klst</b> ef sjúklingur fær ekki blóðþrýstingsfall. Hámarksskammtur 45 µg/kg/klst.  Ekki má gefa Nimotop töflur samtímis.
<b>Annað</b>	<b>Dragið beint úr hettuglasinu í 50 ml sprautu og gefið í sprautudælu. Verjið sprautu og slöngur fyrir ljósi með álpappír.</b>

ATC flokkur C08CA06

Heimildir:

[UpToDate](#)

[Fass.se](#)